



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS**

# MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL DA AMAZÔNIA BRASILEIRA POR SATÉLITES



**Detecção de Desmatamento em Tempo Real - DETER**

**MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL DA  
AMAZÔNIA POR SATÉLITES**

**AVALIAÇÃO DETER – AGOSTO 2008**

**INPE – COORDENAÇÃO GERAL DE OBSERVAÇÃO DA TERRA  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 20 DE SETEMBRO DE 2008**

# 1. INTRODUÇÃO

○ DETER - Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real identifica e mapeia áreas desflorestadas em formações florestais na Amazônia. Esse sistema utiliza imagens dos sensores MODIS, a bordo do satélite TERRA, da NASA, e imagens do WFI, a bordo do satélite brasileiro CBERS-2B do INPE. Esses sensores cobrem a Amazônia com alta frequência temporal, de dois e cinco dias, respectivamente, mas com resolução espacial limitada de 250 metros e 260 metros (WFI). Detalhes sobre a metodologia utilizada pelo DETER podem ser encontrados na página do DETER ([http://www.obt.inpe.br/deter/metodologia\\_v2.pdf](http://www.obt.inpe.br/deter/metodologia_v2.pdf)).

Como claramente explícito na metodologia, é muito importante compreender que o DETER é uma ferramenta para suporte à fiscalização e não um mapa fiel do desmatamento mensal da Amazônia, em função da resolução dos satélites e da cobertura de nuvens variável de um mês para outro.

A qualificação dos dados do DETER tem como objetivo caracterizar os dados de desmatamento (Alerta) referentes às duas quinzenas de cada mês. Para a qualificação, faz-se uso de imagens provenientes de sensores a bordo dos satélites Cbers e Landsat, adquiridas em período equivalente ao das Imagens Modis, com resolução espacial mais fina, de 20 e 30 m, respectivamente.

A qualificação do DETER é amostral, ou seja, apenas uma parte dos Alertas é avaliada. O tamanho da área amostrada e sua representatividade variam a cada mês de acordo com as condições atmosféricas e a disponibilidade de imagens de média resolução. No período seco, em geral, a área amostrada é maior do que no período chuvoso, quando grande parte da região permanece sob nuvens. Desta forma, a qualificação dos Alertas não pode ser vista como um mapeamento mais detalhado do DETER, pois não é possível assegurar uma área mínima a ser amostrada mês a mês.

O DETER mapeia tanto o desmatamento por corte raso quanto as áreas em processo de desmatamento por alteração da cobertura florestal. Como grande parte dessas alterações só é percebida quando há uma alta intensidade de perturbação, a esse tipo de desmatamento denominamos degradação florestal progressiva. Áreas de manejo florestal de baixo impacto, em geral, não são detectadas por esse sistema.

Na qualificação dos desmatamentos, os Alertas são sobrepostos às imagens de resolução espacial mais fina e então são classificados como Corte Raso ou Degradação Florestal de Intensidade Leve, Alta ou Moderada. Nessa avaliação os Alertas não confirmados como desmatamento também são contabilizados. O esquema de classificação é sistematizado e apresentado na Figura 1.




Figura 1. Esquema de Classificação dos dados de Alerta do DETER. As classes finais são representadas pelas caixas verdes: 1) Não confirmado como desmatamento (a); 2) Corte Raso; 3) Degradação Florestal de Intensidades Leve, Moderada e Alta (b).

O desmatamento por corte raso é o processo de remoção total da cobertura florestal em um curto intervalo de tempo. Esse processo é caracterizado nas imagens pela predominância de solo exposto com textura lisa e limites bem definidos entre a área desmatada e a matriz florestal.

Na Figura 2 são apresentados os critérios de foto-interpretação. Os padrões e tipos de cobertura da terra observados nas imagens que definem as classes dos diferentes processos de desmatamento.


<b>Imagem TM/Landsat 2008</b>	<b>Crítérios de Interpretação visual Landsat/TM RGB 543</b>	<b>Cobertura da Terra</b>	<b>Processo de desmatamento</b>
	Predomínio de tonalidade verde, textura rugosa e sombra. Padrão semelhante às florestas da região. Maioria do perímetro contíguo tem o mesmo padrão.	Cobertura florestal , textura heterogênea, com sombra, indicando a estrutura florestal complexa e não alterada.	Floresta não alterada
	Tonalidade magenta, ou verde muito claro (esmaecido). Forma regular, textura lisa, limites bem definidos entre o polígono (solo exposto) e a matriz florestal.	Predomínio de solo exposto ou pastagem em formação.	Corte Raso
	Predomínio de tonalidade verde e padrão de floresta, com presença de feições de tonalidade magenta ou roxa de tamanho pequeno, com baixa densidade e freqüência.	Predomínio de cobertura florestal com manchas de solo exposto indicando a presença de pátios e indícios de acesso.	Floresta Degradada de Intensidade Leve
	Predomínio de tonalidade verde e padrão de floresta, com presença de feições de tonalidade magenta ou roxa, de tamanho médio, com média densidade e freqüência.	Predomínio de cobertura florestal com manchas de solo exposto indicando a presença de pátios de estocagem de madeira, ramais e clareiras.	Floresta Degradada de Intensidade Moderada
	Predomínio de tonalidade magenta/roxa (clareiras grandes com indicação de fogo) ou verde (com textura lisa) em associação com manchas que apresentam padrão de floresta.	Presença de grandes clareiras com solo exposto, vegetação secundária e/ou área extensa de cicatriz de fogo florestal, combinadas com manchas florestais.	Floresta Degradada de Intensidade Alta

Figura 2. Critérios utilizados para a qualificação dos dados do DETER. Padrões de desflorestamento em imagens TM/Landsat, descrições e classes associadas.

O desmatamento por degradação florestal progressiva é um processo gradativo, no qual se observa a perda parcial e contínua da cobertura florestal.

Esse processo é caracterizado pela combinação da floresta com uma ou mais classes de cobertura da terra como solo exposto, cicatriz de fogo florestal e floresta secundária. A proporção dessas classes no polígono do Alerta, bem como sua frequência, densidade e arranjo espacial indicam a intensidade de degradação classificada como Leve, Moderada ou Alta.

A escolha de imagens para a qualificação dos Alertas baseia-se no número de Alertas por cena, na existência de imagens TM/Landsat ou Cbers de boa qualidade para o período e, no seu percentual de cobertura de nuvens. Imagens dos anos anteriores são utilizadas como dado auxiliar durante a foto-interpretação.

## 2. QUALIFICAÇÃO DOS ALERTAS DE AGOSTO/2008

A área desmatada apontada pelos Alertas do DETER no mês de agosto foi de 756 km<sup>2</sup>. A distribuição do desmatamento por Estado é apresentada na Figura 3.



Figura 3. Distribuição dos desmatamentos do mês de agosto por Estado.

Os dados do DETER devem ser analisados em conjunto com os dados de distribuição de nuvens, como os apresentados na Figura 4. A área observada livre da cobertura de nuvens no mês de agosto correspondeu a 74% da Amazônia Legal. Estados como o Amapá e Roraima, por exemplo, não puderam ser monitorados adequadamente, pois apresentaram um alto índice de cobertura de nuvens no período.




Figura 4. Cobertura de nuvens e Cenas TM/Landsat utilizadas para qualificação dos Alertas do mês de agosto de 2008.

A qualificação dos dados do DETER de agosto foi realizada utilizando como referência um conjunto de 18 cenas do sensor TM/Landsat, do mês de agosto ou setembro de 2008, localizadas nos Estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas, apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Cenas TM/Landsat utilizadas na avaliação do DETER de Agosto de 2008.

Cenas TM/Landsat	Data	Estado
223/62	14/08/2008	PA
223/63	14/08/2008	PA
224/62	21/08/2008	PA
224/63	21/08/2008	PA
224/64	21/08/2008	PA
224/66	06/09/2008	PA
225/64	28/08/2008	PA
225/65	28/08/2008	PA
225/68	12/08/2008	MT
227/65	11/09/2008	PA
227/66	26/08/2008	PA
227/68	26/08/2008	MT
228/61	02/09/2008	PA
228/67	17/08/2008	MT
229/66	24/08/2007	AM
229/67	24/08/2008	MT
230/66	15/08/2008	AM
230/67	31/08/2008	MT

Foram avaliados 420 Alertas (ou polígonos de desmatamento), representando 446 km<sup>2</sup> ou 59 % da área total dos polígonos (756 km<sup>2</sup>) indicados pelo DETER no mês de agosto. Essa amostragem foi considerada representativa e suficiente para a qualificação dos dados.

Do total avaliado, 89% da área total dos Alertas foi confirmada como desmatamento e, 11% não apresentou indícios de desmatamento nas imagens de referência. O gráfico da Figura 5 e a Tabela 2 apresentam a síntese dos resultados dessas análises.

De acordo com a Tabela 2, da área total dos Alertas confirmados como desmatamento, 67,5% foram classificados como corte raso e 21,4% como floresta degradada. As áreas classificadas como floresta degradada de alta intensidade representaram 17% da área dos polígonos de Alerta e as de intensidade moderada e leve, totalizaram 4,5%, demonstrando que estágios iniciais e intermediários de degradação não são detectados com a mesma eficiência.




Figura 5. Proporção da área de Alertas qualificados como desmatamento por corte raso, degradação florestal Alta, Moderada e Leve e, não confirmados.

Tabela 2. Resultado da qualificação dos dados de agosto do DETER.

	Área (km <sup>2</sup> )	Confirmação (%)
1. Desmatamento	237,3	89,0%
1.1 Corte_raso	193,7	67,5%
1.2.Floresta_degradada_Alta	35,1	17,0%
1.3.Floresta_degradada_Moderada	5,2	3,1%
1.4.Floresta_degradada_Leve	3,3	1,4%
2. Não confirmado	6,5	11,0%
Total	243,7	

Os Alertas não confirmados como desmatamento corresponderam a 11% da área total dos polígonos, a maior parte deles com tamanho menor que 2 km<sup>2</sup> (200 ha) (Tabela 3). O gráfico da Figura 6 mostra o resultado da análise por área e faixas de tamanho dos Alertas. Os índices de não confirmação, variaram de 0 a 4,3% nas diferentes faixas de tamanho. Esse indicador sustenta o uso dos Alertas para a fiscalização, principal objetivo do DETER, uma vez que facilita a escolha e priorização dos Alertas para a vistoria de campo.

Tabela 3. Análise dos Alertas por área e faixas de tamanho.

Classes	Faixas de Tamanho					
	10.3%	26.0%	28.9%	19.1%	5.2%	10.5%
	<=0.5	0.5 a 1	1 a 2	2 a 5	5 a 10	>10
Corte raso	8.1%	18.8%	22.6%	11.4%	1.2%	5.4%
Floresta degradada Alta	0.4%	1.1%	2.7%	5.6%	2.1%	5.0%
Floresta degradada Moderada	0.4%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Floresta degradada Leve	0.1%	1.4%	0.6%	0.9%	0.0%	0.0%
Não confirmado	1.1%	4.3%	2.4%	1.3%	1.9%	0.0%




Figura 6. Qualificação dos Alertas por área e faixas de tamanho.

### 3. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos da avaliação de agosto indicam um bom desempenho do DETER, com 89% da área dos Alertas confirmada como desmatamento. Foram avaliados 420 Alertas, representando 446 km<sup>2</sup> ou 59% da área total dos polígonos (756 km<sup>2</sup>) indicados pelo DETER no mês de agosto.

Os Alertas indicaram principalmente desmatamentos por corte raso (67,5%) e por degradação florestal de intensidade Alta (17%), categorias em que a resposta do solo é predominante sobre a cobertura florestal escassa. O sistema DETER foi preciso na detecção de polígonos principalmente nas faixas de tamanho maiores que 1 km<sup>2</sup> (100 ha), fato decorrente da resolução espacial de 250 m das imagens Modis.

Os resultados obtidos na qualificação dos Alertas de agosto mostraram-se consistentes com as avaliações realizadas para o período de agosto de 2006 a julho de 2007 e avaliações mensais disponíveis na página do DETER (<http://www.obt.inpe.br/deter>).



Ministério da  
Ciência e Tecnologia

