



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
**INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS**

# MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL DA AMAZÔNIA BRASILEIRA POR SATÉLITES



**Detecção de Desmatamento em Tempo Real - DETER**

**MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL DA  
AMAZÔNIA POR SATÉLITES**

**AVALIAÇÃO DETER – OUTUBRO DE 2008**

**INPE – COORDENAÇÃO GERAL DE OBSERVAÇÃO DA TERRA  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 25 DE NOVEMBRO DE 2008**

# 1. INTRODUÇÃO

**O** DETER – Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real identifica e mapeia áreas desflorestadas em formações florestais na Amazônia. Esse sistema utiliza imagens dos sensores MODIS, a bordo do satélite TERRA, da NASA, e imagens do WFI, a bordo do satélite brasileiro CBERS-2B do INPE. Esses sensores cobrem a Amazônia com alta frequência temporal, de dois e cinco dias, respectivamente, mas com resolução espacial limitada de 250 metros e 260 metros (WFI). Detalhes sobre a metodologia utilizada pelo DETER podem ser encontrados na página do DETER ([http://www.obt.inpe.br/deter/metodologia\\_v2.pdf](http://www.obt.inpe.br/deter/metodologia_v2.pdf)).

Como claramente explícito na metodologia, é importante ressaltar que o DETER é uma ferramenta concebida para dar suporte à fiscalização e não para fornecer um mapa fiel do desmatamento mensal da Amazônia. Isso é devido à resolução pouco detalhada dos satélites utilizados e à cobertura de nuvens, variável de um mês para outro. A vantagem desse sistema está na rapidez com que o DETER é capaz de detectar novos desflorestamentos, possibilitando gerar em um curto período de tempo, dados para a fiscalização. Essa agilidade dá a possibilidade de conter os desmatamentos antes que o mesmo tenha se completado.

A qualificação dos dados do DETER tem como objetivo caracterizar os dados de desmatamento (Alerta) referentes às duas quinzenas de cada mês. Para a qualificação, faz-se uso de imagens provenientes de sensores a bordo dos satélites Cbers e Landsat, adquiridas em período equivalente ao das Imagens Modis, com resolução espacial mais fina, de 20 e 30 m, respectivamente.

A qualificação do DETER é amostral, ou seja, apenas uma parte dos Alertas é avaliada. O tamanho da área amostrada e sua representatividade variam a cada mês de acordo com as condições atmosféricas e a disponibilidade de imagens de média resolução. No período seco, em geral, a área amostrada é maior do que no período chuvoso, quando grande parte da região permanece sob nuvens. Desta forma, a qualificação dos Alertas não pode ser vista como um mapeamento mais detalhado do DETER, pois não é possível assegurar uma área mínima a ser amostrada mês a mês.

O DETER mapeia tanto o desmatamento por corte raso quanto as áreas em processo de desmatamento por alteração da cobertura florestal. Como grande parte dessas alterações só é percebida quando há uma alta intensidade de perturbação, a esse tipo de desmatamento denominamos degradação florestal progressiva. Áreas de manejo florestal de baixo impacto, em geral, não são detectadas por esse sistema.

Na qualificação dos desmatamentos, os Alertas são sobrepostos às imagens de resolução espacial mais fina e então são classificados como Corte Raso ou Degradação Florestal de Intensidade Leve, Alta ou

Moderada. Nessa avaliação os Alertas não confirmados como desmatamento também são contabilizados. O esquema de classificação é sistematizado e apresentado na Figura 1.




Figura 1. Esquema de Classificação dos dados de Alerta do DETER. As classes finais são representadas pelas caixas verdes: 1) Não confirmado como desmatamento (a); 2) Corte Raso; 3) Degradação Florestal de Intensidades Leve, Moderada e Alta (b).

O desmatamento por corte raso é o processo de remoção total da cobertura florestal em um curto intervalo de tempo. Esse processo é caracterizado nas imagens pela predominância de solo exposto com textura lisa e limites bem definidos entre a área desmatada e a matriz florestal.

Na Figura 2 são apresentados os critérios de foto-interpretação. Os padrões e tipos de cobertura da terra observados nas imagens que definem as classes dos diferentes processos de desmatamento.


<b>Imagem TM/Landsat 2008</b>	<b>Crítérios de Interpretação visual Landsat/TM RGB 543</b>	<b>Cobertura da Terra</b>	<b>Processo de desmatamento</b>
	Predomínio de tonalidade verde, textura rugosa e sombra. Padrão semelhante às florestas da região. Maioria do perímetro contíguo tem o mesmo padrão.	Cobertura florestal, textura heterogênea, com sombra, indicando a estrutura florestal complexa e não alterada.	Floresta não alterada
	Tonalidade magenta, ou verde muito claro (esmaecido). Forma regular, textura lisa, limites bem definidos entre o polígono (solo exposto) e a matriz florestal.	Predomínio de solo exposto ou pastagem em formação.	Corte Raso
	Predomínio de tonalidade verde e padrão de floresta, com presença de feições de tonalidade magenta ou roxa de tamanho pequeno, com baixa densidade e freqüência.	Predomínio de cobertura florestal com manchas de solo exposto indicando a presença de pátios e indícios de acesso.	Floresta Degradada de Intensidade Leve
	Predomínio de tonalidade verde e padrão de floresta, com presença de feições de tonalidade magenta ou roxa, de tamanho médio, com média densidade e freqüência.	Predomínio de cobertura florestal com manchas de solo exposto indicando a presença de pátios de estocagem de madeira, ramais e clareiras.	Floresta Degradada de Intensidade Moderada
	Predomínio de tonalidade magenta/roxa (clareiras grandes com indicação de fogo) ou verde (com textura lisa) em associação com manchas que apresentam padrão de floresta.	Presença de grandes clareiras com solo exposto, vegetação secundária e/ou área extensa de cicatriz de fogo florestal, combinadas com manchas florestais.	Floresta Degradada de Intensidade Alta

Figura 2. Critérios utilizados para a qualificação dos dados do DETER. Padrões de desflorestamento em imagens TM/Landsat, descrições e classes associadas.

O desmatamento por degradação florestal progressiva é um processo gradativo, no qual se observa a perda parcial e contínua da cobertura florestal. Esse processo é caracterizado pela combinação da floresta com uma ou mais classes de cobertura da terra como solo exposto, cicatriz de fogo florestal e floresta secundária. A proporção dessas classes no polígono do Alerta, bem como sua frequência, densidade e arranjo espacial indicam a intensidade de degradação classificada como Leve, Moderada ou Alta.

A escolha de imagens para a qualificação dos Alertas baseia-se no número de Alertas por cena, na existência de imagens TM/Landsat ou Cbers de boa qualidade para o período e, no seu percentual de cobertura de nuvens. Imagens dos anos anteriores são utilizadas como dado auxiliar durante a foto-interpretação

## 2. QUALIFICAÇÃO DOS ALERTAS DE OUTUBRO DE 2008

**A** área desmatada apontada pelos Alertas do DETER no mês de outubro foi de 541 km<sup>2</sup>. A distribuição do desmatamento por Estado é apresentada na Figura 3.

Os dados do DETER devem ser analisados em conjunto com os dados de distribuição de nuvens, como os apresentados na Figura 4. A área observada livre da cobertura de nuvens no mês de outubro correspondeu a 73% da Amazônia Legal. Estados como o Amapá, e parte do Amazonas e Pará, por exemplo, não puderam ser monitorados adequadamente, pois apresentaram um alto índice de cobertura de nuvens no período.




Figura 3. Distribuição dos 541 km<sup>2</sup> de desmatamento no mês de outubro por Estado.

A qualificação dos dados do DETER do mês de outubro foi realizada utilizando como referência um conjunto de 11 cenas do sensor TM/Landsat dos meses de outubro e novembro de 2008. As imagens analisadas são referentes aos Estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e Maranhão, e são listadas na Tabela 1.

Foram avaliados 212 Alertas (ou polígonos de desmatamento), representando 216 km<sup>2</sup> ou 40 % da área total dos polígonos (541 km<sup>2</sup>) indicados pelo DETER no mês de outubro. Essa amostragem foi considerada representativa e suficiente para a qualificação dos dados.




Figura 4. Cobertura de nuvens e Cenas TM/Landsat utilizadas para qualificação dos Alertas do mês de outubro de 2008.

Tabela 1. Cenas TM/Landsat utilizadas na avaliação do DETER de Outubro de 2008.

Cenas TM/Landsat	Data	Estado
22263	26/10/2008	MA
22468	9/11/2008	MT
22565	15/10/2008	PA
22765	13/10/2008	PA
22766	13/10/2008	PA
22770	14/11/2008	MT
22967	27/10/2008	MT
22970	27/10/2008	MT
23068	3/11/2008	RO
23267	16/10/2008	RO
23367	23/10/2008	RO

Do total dos Alertas avaliados, 98% da área foi confirmada como desmatamento e 2% não apresentou indícios de desmatamento nas imagens de referência. O gráfico da Figura 5 e a Tabela 2 apresentam a síntese dos resultados dessas análises.

De acordo com a Tabela 2, da área total dos Alertas confirmados como desmatamento, 70% foi classificada como corte raso e 28% como floresta degradada. As áreas classificadas como floresta degradada de alta intensidade representaram 23% da área dos polígonos de Alerta e as de intensidade moderada e leve, totalizaram 5%, demonstrando que estágios iniciais e intermediários de degradação são detectados com menos eficiência.




Figura 5. Proporção da área de Alertas qualificados como desmatamento por corte raso, degradação florestal Alta, Moderada e Leve e, não confirmados.

Tabela 2. Resultado da qualificação dos dados de outubro do DETER.

	Área (km <sup>2</sup> )	Confirmação (%)
1. Desmatamento	211,7	98,1%
1.1 Corte_raso	151,7	70,3%
1.2.Floresta_degradada_Alta	48,8	22,6%
1.3.Floresta_degradada_Moderada	6,5	3,0%
1.4.Floresta_degradada_Leve	4,7	2,2%
2. Não confirmado	4,0	1,9%
<b>Total</b>	<b>215,8</b>	

A tabela 3 e o gráfico da Figura 6 mostram o resultado da análise por área e faixas de tamanho dos Alertas. Os Alertas classificados como não confirmados (1,9 %), foram poucos e tinham área menor que 2 km<sup>2</sup> (200 ha). Na análise por faixas de tamanho (Tabela 3) pode-se observar que os índices de não confirmação foram baixos, variaram de 0 a 0,8% nas faixas de tamanho estabelecidas.

Também é possível observar na Tabela 03 que no mês de outubro 21% dos Alertas tinham área maior que 10 km<sup>2</sup> (1000 ha). Grande parte desses Alertas (14%) foi qualificada como floresta degradada de intensidade alta, evidenciada ou pelo predomínio da resposta do solo em relação à cobertura vegetal ou pela presença de grandes manchas de cicatriz de fogo florestal. Esse indicador sustenta o uso dos Alertas para a fiscalização, principal objetivo do DETER, uma vez que facilita a escolha e priorização dos Alertas para a vistoria de campo.

Tabela 3. Análise dos Alertas por área e faixas de tamanho.

Classes	Faixas de Tamanho					
	<=0.5	0.5 a 1	1 a 2	2 a 5	5 a 10	>10
Km <sup>2</sup>	16.0%	25.6%	20.5%	3.3%	12.9%	21.7%
Corte raso	13.4%	22.3%	15.1%	3.3%	9.0%	7.3%
Floresta degradada Alta	0.8%	1.4%	2.0%	0.0%	4.0%	14.4%
Floresta degradada Moderada	0.3%	0.7%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Floresta degradada Leve	1.1%	0.3%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
Não confirmado	0.5%	0.8%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%




Figura 6. Qualificação dos Alertas por área e faixas de tamanho.

### 3. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos da avaliação de outubro indicam um excelente desempenho do DETER, com 98% da área dos Alertas confirmada como desmatamento. Foram avaliados 212 polígonos de desmatamento, representando 216 km<sup>2</sup> ou 40% da área total dos Alertas (541 km<sup>2</sup>) indicados pelo DETER no mês de outubro.

Os Alertas indicaram principalmente desmatamentos por corte raso (70%) e por degradação florestal de intensidade Alta (28%), categorias em que a resposta do solo é predominante sobre a cobertura florestal escassa. O sistema DETER foi preciso na detecção de polígonos em todas as faixas de tamanho, e teve confirmado todos os polígonos analisados com área maior que 2 km<sup>2</sup> (200 ha).

Os resultados obtidos na qualificação dos Alertas de outubro mostraram-se consistentes com as avaliações realizadas para o período de agosto de 2006 a julho de 2007 e as avaliações mensais disponíveis na página do DETER (<http://www.obt.inpe.br/deter>).



Ministério da  
Ciência e Tecnologia

