



DETER JUNHO de 2011 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Os objetivos da qualificação dos dados do DETER são:

A) Qualificar o alerta emitido pelo DETER em relação aos processos de desmatamento, confrontando os polígonos com imagens de melhor resolução dos satélites CBERS ou LANDSAT

B) Estabelecer o nível de "Confirmação" e "Não Confirmação" dos alertas emitidos

1) A área desmatada apontada pelo DETER para JUNHO de 2011 foi de:

AM = 41.7 km²

MA = 5.2 km²


MT = 81.5 km²

PA = 119.6 km²


RO = 64.2 km²

TO = 0.5 km²

Total = 312.7 km²




1.1) Mapa dos alertas do Deter no mês 06/2011:




obs: as nuvens correspondem aos polígonos em rosa

2) A cobertura de nuvens mapeada pelo DETER para JUNHO de 2011 foi de 21 % para toda Amazônia Legal



2.1) Mapa de nuvens no mês 06/2011:




obs: as nuvens correspondem aos polígonos em rosa

3) Área e quantidade de polígonos avaliados:

A área total avaliada para JUNHO de 2011 foi de **191.36 km²** (**210** polígonos) o que corresponde a **61.2 %** da área e **57.4 %** dos polígonos.

4) Cenas utilizadas na avaliação:


Nr	Satelite	Orbita Ponto	Data	Mes Deter	Estado
1	Landsat	224/67	2011-06-27	6/2011	MT
2	Landsat	225/62	2011-07-04	6/2011	PA
3	Landsat	225/65	2011-06-02	6/2011	PA
4	Landsat	226/64	2011-06-09	6/2011	PA
5	Landsat	226/67	2011-06-09	6/2011	MT
6	Landsat	226/69	2011-06-09	6/2011	MT
7	Landsat	227/68	2011-06-16	6/2011	MT
8	Landsat	227/69	2011-06-16	6/2011	MT
9	Landsat	228/68	2011-06-23	6/2011	MT
10	Landsat	229/70	2011-06-30	6/2011	MT
11	Landsat	230/67	2011-06-21	6/2011	MT
12	Landsat	230/68	2011-06-21	6/2011	RO
13	Landsat	231/66	2011-06-12	6/2011	AM
14	Landsat	232/66	2011-07-05	6/2011	RO
15	Landsat	232/67	2011-07-05	6/2011	RO
16	Landsat	233/66	2011-07-12	6/2011	AM
17	Landsat	233/67	2011-07-12	6/2011	RO
18	Landsat	233/68	2011-07-12	6/2011	RO



obs: as nuvens correspondem aos polígonos em rosa


5) Proporção dos Alertas de desmatamento qualificados como Corte Raso, Degradação Florestal Alta, Moderada e Leve e Não Confirmados:

Corte_raso = 117.74 km²
 Floresta_degradada_Alta = 50.84 km²
 Floresta_degradada_Leve = 4.17 km²
 Floresta_degradada_Moderada = 5.31 km²
 Nao Confirmado = 13.29 km²



6) Proporção dos Alertas de desmatamento por faixa de tamanho:

<= 0.5 km2: Corte_raso = 23.63 km2
 <= 0.5 km2: Floresta_degradada_Alta = 1.52 km2
 <= 0.5 km2: Floresta_degradada_Leve = 0.68 km2
 <= 0.5 km2: Floresta_degradada_Moderada = 0.78 km2
 <= 0.5 km2: Nao Confirmado = 4.10 km2
 0.5 a 1 Km2: Corte_raso = 42.59 km2
 0.5 a 1 Km2: Floresta_degradada_Alta = 8.40 km2
 0.5 a 1 Km2: Floresta_degradada_Leve = 0.56 km2
 0.5 a 1 Km2: Floresta_degradada_Moderada = 1.96 km2
 0.5 a 1 Km2: Nao Confirmado = 4.72 km2
 1 a 2 Km2: Corte_raso = 28.64 km2
 1 a 2 Km2: Floresta_degradada_Alta = 9.11 km2
 1 a 2 Km2: Floresta_degradada_Leve = 2.94 km2
 1 a 2 Km2: Nao Confirmado = 1.32 km2
 2 a 5 Km2: Corte_raso = 4.27 km2
 2 a 5 Km2: Floresta_degradada_Alta = 7.59 km2
 2 a 5 Km2: Floresta_degradada_Moderada = 2.57 km2
 2 a 5 Km2: Nao Confirmado = 3.15 km2
 5 a 10 Km2: Corte_raso = 18.61 km2
 5 a 10 Km2: Floresta_degradada_Alta = 24.22 km2




7) Proporção dos Alertas de desmatamento por Orbita Ponto LANDSAT 5/TM e/ou CBERS 2B/CCD:

22467: Corte_raso = 1.63 km2
 22467: Floresta_degradada_Alta = 3.75 km2
 22467: Floresta_degradada_Moderada = 0.49 km2
 22562: Corte_raso = 42.37 km2
 22562: Floresta_degradada_Leve = 0.29 km2
 22562: Nao Confirmado = 0.47 km2
 22563: Corte_raso = 3.38 km2
 22565: Corte_raso = 2.01 km2
 22565: Floresta_degradada_Alta = 0.52 km2
 22565: Floresta_degradada_Leve = 2.94 km2
 22664: Corte_raso = 9.19 km2

22664: Nao Confirmado = 0.48 km2
22665: Corte_raso = 0.42 km2
22667: Corte_raso = 3.51 km2
22667: Nao Confirmado = 1.82 km2
22669: Corte_raso = 3.09 km2
22669: Floresta_degradada_Moderada = 0.82 km2
22669: Nao Confirmado = 1.59 km2
22768: Corte_raso = 2.32 km2
22768: Floresta_degradada_Alta = 1.35 km2
22768: Floresta_degradada_Moderada = 0.53 km2
22768: Nao Confirmado = 0.36 km2
22769: Corte_raso = 1.98 km2
22769: Floresta_degradada_Moderada = 2.57 km2
22868: Floresta_degradada_Alta = 7.85 km2
22970: Corte_raso = 2.07 km2
22970: Nao Confirmado = 3.69 km2
23067: Corte_raso = 0.97 km2
23068: Floresta_degradada_Alta = 12.53 km2
23068: Floresta_degradada_Leve = 0.56 km2
23068: Nao Confirmado = 0.69 km2
23166: Corte_raso = 8.92 km2
23166: Floresta_degradada_Alta = 5.01 km2
23166: Nao Confirmado = 0.32 km2
23167: Corte_raso = 0.52 km2
23266: Corte_raso = 13.51 km2
23266: Floresta_degradada_Alta = 3.35 km2
23266: Nao Confirmado = 0.95 km2
23267: Corte_raso = 12.11 km2
23267: Floresta_degradada_Leve = 0.39 km2
23267: Floresta_degradada_Moderada = 0.29 km2
23267: Nao Confirmado = 0.49 km2
23366: Corte_raso = 5.75 km2
23366: Floresta_degradada_Alta = 7.05 km2
23366: Floresta_degradada_Moderada = 0.61 km2
23366: Nao Confirmado = 1.32 km2
23367: Corte_raso = 4.00 km2
23367: Floresta_degradada_Alta = 2.05 km2
23367: Nao Confirmado = 1.13 km2
23368: Floresta_degradada_Alta = 7.38 km2

Distribuição das áreas



8) Metodologia da Qualificação:

O DETER - Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real identifica e mapeia áreas desflorestadas em formações florestais na Amazônia. Esse sistema utiliza imagens dos sensores MODIS, a bordo do satélite TERRA, da NASA, e imagens do WFI, a bordo do satélite brasileiro CBERS-2B do INPE. Esses sensores cobrem a Amazônia com alta frequência temporal, de dois e cinco dias, respectivamente, mas com resolução espacial limitada de 250 metros e 260 metros (WFI). Detalhes sobre a metodologia utilizada pelo DETER podem ser encontrados na página do DETER (http://www.obt.inpe.br/deter/metodologia_v2.pdf).

Como claramente explícito na metodologia, é importante ressaltar que o DETER é uma ferramenta concebida para dar suporte à fiscalização e não para fornecer um mapa fiel do desmatamento mensal da Amazônia. Isso é devido à resolução pouco detalhada dos satélites utilizados e à cobertura de nuvens, variável de um mês para outro. A vantagem desse sistema está na rapidez com que o DETER é capaz de detectar novos desflorestamentos, possibilitando gerar em um curto período de tempo, dados para a fiscalização. Essa agilidade dá a possibilidade de conter os desmatamentos antes que o mesmo tenha se completado.

A qualificação dos dados do DETER tem como objetivo caracterizar os dados de desmatamento (Alerta) referentes às duas quinzenas de cada mês. Para a qualificação, faz-se uso de imagens provenientes de sensores a bordo dos satélites Cbers e Landsat, adquiridas em período equivalente ao das Imagens Modis, com resolução espacial mais fina, de 20 e 30 m, respectivamente.

A qualificação do DETER é amostral, ou seja, apenas uma parte dos Alertas é avaliada. O tamanho da área amostrada e sua representatividade variam a cada mês de acordo com as condições atmosféricas e a disponibilidade de imagens de média resolução. No período seco, em geral, a área amostrada é maior do que no período chuvoso, quando grande parte da região permanece sob nuvens. Desta forma, a qualificação dos Alertas não pode ser vista como um mapeamento mais detalhado do DETER, pois não é possível assegurar uma área mínima a ser amostrada mês a mês.

O DETER mapeia tanto o desmatamento por corte raso quanto as áreas em processo de desmatamento por alteração da cobertura florestal. Como grande parte dessas alterações só é percebida quando há uma alta intensidade de perturbação, a esse tipo de desmatamento denominamos degradação florestal progressiva. Áreas de manejo florestal de baixo impacto, em geral, não são detectadas por esse sistema.

Na qualificação dos desmatamentos, os Alertas são sobrepostos às imagens de resolução espacial mais fina e então são classificados como Corte Raso ou Degradação Florestal de Intensidade Leve, Alta ou Moderada. Nessa avaliação os Alertas não confirmados como desmatamento também são contabilizados. O esquema de classificação é sistematizado e apresentado na Figura 1.




Figura 1. Esquema de Classificação dos dados de Alerta do DETER. As classes finais são representadas pelas caixas verdes: 1) Não confirmado como desmatamento (a); 2) Corte Raso; 3) Degradação Florestal de Intensidades Leve, Moderada e Alta (b).

O desmatamento por corte raso é o processo de remoção total da cobertura florestal em um curto intervalo de tempo. Esse processo é caracterizado nas imagens pela predominância de solo exposto com textura lisa e limites bem definidos entre a área desmatada e a matriz florestal.

Na Figura 2 são apresentados os critérios de foto-interpretação. Os padrões e tipos de cobertura da terra observados nas imagens que definem as classes dos diferentes processos de desmatamento.

O desmatamento por degradação florestal progressiva é um processo gradativo, no qual se observa a perda parcial e contínua da cobertura florestal. Esse processo é caracterizado pela combinação da floresta com uma ou mais classes de cobertura da terra como solo exposto, cicatriz de fogo florestal e floresta secundária. A proporção dessas classes no polígono do Alerta, bem como sua frequência, densidade e arranjo espacial indica a intensidade de degradação classificada como Leve, Moderada ou Alta. A escolha de imagens para a qualificação dos Alertas baseia-se no número de Alertas por cena, na existência de imagens TM/Landsat ou Cbers de boa qualidade para o período e, no seu percentual de cobertura de nuvens. Imagens dos anos anteriores são utilizadas como dado auxiliar durante a foto-interpretação.





Imagem TM/Landsat 2008	Crítérios de Interpretação visual Landsat/TM RGB 543	Cobertura da Terra	Processo de desmatamento
	Predomínio de tonalidade verde, textura rugosa e sombria. Padrão semelhante às florestas da região. Maioria do perímetro contíguo tem o mesmo padrão.	Cobertura florestal, textura heterogênea, com sombra, indicando a estrutura florestal complexa e não alterada.	Floresta não alterada
	Tonalidade magenta, ou verde muito claro (esmaecido). Forma regular, textura lisa, limites bem definidos entre o polígono (solo exposto) e a matriz florestal.	Predomínio de solo exposto ou pastagem em formação.	Corte Raso
	Predomínio de tonalidade verde e padrão de floresta, com presença de feições de tonalidade magenta ou roxa de tamanho pequeno, com baixa densidade e frequência.	Predomínio de cobertura florestal com manchas de solo exposto indicando a presença de paliões e indícios de acesso.	Floresta Degradada de Intensidade Leve
	Predomínio de tonalidade verde e padrão de floresta, com presença de feições de tonalidade magenta ou roxa, de tamanho médio, com média densidade e frequência.	Predomínio de cobertura florestal com manchas de solo exposto indicando a presença de paliões de estocagem de madeira, ramais e clareiras.	Floresta Degradada de Intensidade Moderada
	Predomínio de tonalidade magenta/roxa (clareiras grandes com indicação de fogo) ou verde (com textura lisa) em associação com manchas que apresentam padrão de floresta.	Presença de grandes clareiras com solo exposto, vegetação secundária e/ou área edensada de cicatriz de fogo florestal, combinadas com manchas florestais.	Floresta Degradada de Intensidade Alta

Figura 2. Critérios utilizados para a qualificação dos dados do DETER. Padrões de desflorestamento em imagens TM/Landsat, descrições e classes associadas.